1 je coupe l'humerus et le femur de devant en arrière selon leur longueur.

je les coupe encore l'un et l'autre à trois hauteurs —
differentes sur ~~deux~~ divers sujets adultes et sains, sçavoir —
au 1.er tiers sup A au milieu B et au dernier tiers inferieur C j'en useray
de même par rapport aux autres os ~~les~~ que j'examinerai —
pareillement dans l'etat de santé et ensuite par rapport à tous les
os longs malades qui seront parvenus a ma connoissance —
et que je trouverai devoir comparer a ces os sains

je trouve qu'en general l'humerus est plus gros en haut qu'en
bas en devant que sur les cotés et qu'il va toujours en diminuant
dans la coupe 1.re
depuis sa tete et son col. jusqu'aux deux fosses l'une anterieure —
l'autre posterieure qui sont au dessus de la poulie ou seront les —
cubitus. que dans les 2 tiers sup.rs ou environ il a plus d'epaisseur
de devant en arriere que de droite a gauche c'est le contraire dans
le dernier tiers inferieur — que la ~~lame~~ substance compacte qui n'a guere
~~qu'un~~ qu'un sixieme de ligne sur la tete de cet os va croissant d'epaisseur
jusqu'a 3 lignes ~~[illegible]~~ qu'elle croit d'epaisseur a mesure que le
descend et que c'est vis a vis le 3.e tiers de l'os. la ou il est plus etroit de

devant

ARC 19 d 2 (1.7.4)

2 devant en arrière quelle est plus epaisse

que la cavite medullaire est plus large en haut au 1er tiers sup quau —

milieu, au milieu quau 3e tiers inf. que ses os la 3e tiers

elles se courbes en devant.

dans les coupes transversales on remarque ce qui suit

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE